

在家中 需要注意什么



检查后的一到两天内，您可能感觉不适、尿灼热或尿里带血。

如果您没有饮水量的限制，检查后的1-2天，每天喝2-3公升的水。

重要讯息：

如果出现以下任何一种情况：

- 尿液带有鲜红色血液或暗红的血块
- 腹痛及恶心
- 持续发烧 (> 38.5°C) 或发冷
- 排尿困难或无法排尿

请于办公时间 (周一至周五, 上午8点30分至下午5点) 致电 (65) 6772 5087, 或在非办公时间携带检查报告前往急诊部门。

预约改期：

如果要取消或更改预约日期，请至少提前一周联络我们。

电话：(65) 6772 5087

周一至周五, 上午8点30分至下午5点

电邮地址：

urology_centre@nuhs.edu.sg

国大 医院

所刊登的信息在印刷时(2022年9月)皆属准确无误。如有更改,恕不另行通知。

此刊物所提供的信息纯属教育用途,不能代替医疗诊断或治疗。您在开始任何治疗前,或对健康、身体状况或医疗症状有任何疑问时,应向您的医生或合格的保健人员寻求建议。



最近的地铁站: 肯特岗站 (环线)

联络详情

国大医院医疗中心
(NUH Medical Centre)
泌尿中心, 16楼

预约热线：
(65) 6908 2222

电邮：
urology_centre@nuhs.edu.sg

服务时间
周一至周五：
上午8点30分至下午5点
周六、周日及公共假期休息

版权所有 (2022 年)。
国大医院。
保留所有权利。
未经国立大学医院书面许可,
不得复制本宣传册的任何部分。

国大医院
5 Lower Kent Ridge Road
Singapore 119074
电话：(65) 6908 2222
网站：www.nuh.com.sg


公司注册号：198500843R

软性 膀胱镜检查




什么是软性膀胱镜检查？

软性膀胱镜检查是用内窥镜，通过尿道检查男性或女性的下泌尿道。检查所用的内窥镜是一条一端配有光源和摄像头的细软管。



为何要进行软性膀胱镜检查？



找出可能导致血尿（肉眼可能看不到）的病因

检查尿道是否阻塞（例如前列腺肿大或尿道狭窄）

找出明显的膀胱病变，特别是CT扫描可能遗漏的小病灶

评估其他泌尿系统病症，例如尿液中的白细胞以及持续的下泌尿道症状

探查血尿 — 这是膀胱癌最常见的症状。其他症状，包括膀胱感染和发炎，男性则会有前列腺出血

膀胱镜检查

膀胱镜检查是一项在门诊进行的检查。检查时医生会使用麻醉凝胶来局部麻醉尿道，凝胶也起到润滑作用。大部分人在检查时只有轻微的不适，一般不需要额外的麻醉。

如果感觉不适、发烧、或排尿时疼痛或有灼热感，请告知我们的医护人员。

检查前：

- 无需禁食：请如常饮食和服药。

检查期间：

- 检查前须换上**检查袍**。
- 清洁您的私处后，医护人员会为您放置**麻醉凝胶**。
- 检查时会用生理盐水注满膀胱，您可能会感觉轻微不适和尿急，但通常不会有强烈痛感。
- 膀胱镜检查一般只需要**3-5分钟**。

检查之后：

- 检查后即可排尿。
- 医护人员会马上告诉您膀胱镜检查的结果和后续指示。
- 检查完毕，当天即可回家，并如常活动、饮食及服药。